

LEES MEER OVER IPF EN LONGFIBROSE OP DE WEBSITE VAN DE
PATIËNTENVERENIGING WWW.LONGFIBROSE.NL



REFERENTIES

1. Wells A.U. et al. (2015) "Challenges in IPF diagnosis, current management and future perspectives" *Mattioli1885journals.com. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis* 2015; 32; Suppl 1: 28-35.
2. Maher, T. M. et al. (2017) "Unmet needs in the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis-insights from patient chart review in five European countries," *BMC pulmonary medicine*. BioMed Central, 17(1), s. 124. doi: 10.1186/s12890-017-0468-5.

build

Een nieuw kader voor
interstitiële longziekten

**IPF VRAAGT OM
DIRECTE ACTIE**

SLUIPMOORDENAAR

Idiopathische Pulmonale Fibrose (IPF) wordt gekenmerkt door progressieve dyspneu en leidt gewoonlijk tot respiratoire insufficiëntie binnen 5 jaar na de diagnose.¹

IPF is de meest voorkomende idiopathische fibrotische longziekte. Het komt meer voor dan veel soorten kanker en heeft een slechtere prognose dan de meeste ervan.¹ Echter, uit onderzoek blijkt dat patiënten vaak verschillende artsen raadplegen voor de diagnose IPF wordt gesteld. In de meeste gevallen duurt het meer dan een jaar voor de diagnose is bevestigd.²

IMPACT VAN IPF


Ron* was 69 toen hij kortademig werd en een chronische, droge hoest kreeg. Hij had het al een hele tijd toen zijn vrouw hem eindelijk kon overtuigen om een arts te raadplegen. Toen de arts zijn longen beluisterde, hoorde hij een krakend geluid, alsof je klittenband lostrekt.

Nadat hij een jaar lang van de ene naar de andere arts werd gestuurd, werd Ron eindelijk verwezen naar een expertisecentrum voor een hoge resolutie computertomografie (HRCT-scan). Daar heeft een longarts de diagnose IPF gesteld.

*Dit is een fictieve patiënten casus

KOSTBARE TIJD

Hoewel het verlies van longfunctie onvoorspelbaar is, zijn er wel al medicijnen beschikbaar die de ziekteprogressie kunnen afremmen. Een afwachtende houding aannemen na de diagnose is nadelig voor de patiënt omdat een snelle diagnose een groot verschil kan maken.



Rood = verschillende mogelijke ziekteverlopen

Groen = verwachte hypothetische resultaten voor behandelde patiënten na een late diagnose

Blauw = patiënten die zijn behandeld na een vroege

A = snelle achteruitgang zonder behandeling

B = episodes van acute verslechtering

C = chronische, progressieve achteruitgang zonder behandeling

D = tragere achteruitgang zonder behandeling

= periodes van relatieve stabiliteit afgewisseld met periodes van acute verslechteringakuutin heikentymisen aikana.

IPF VRAAGT OM DIRECTE ACTIE

KOM NU IN ACTIE

Voor Ron was de diagnose IPF beter dan helemaal geen diagnose. Wanneer u de longen van een patiënt beluisterd en u hoort een krakend klittenbandgeluid, denk dan onmiddellijk aan IPF. Verwijs uw patiënten naar een specialist want een vroegtijdige behandeling kan de prognose van IPF verbeteren.²